

UYUŐTURUCU MADDE KULLANIM İŐARETLERİ

- Yorgunluk
- Süre giden sađlık sorunları
- Kızarmıő gözler ve donuk bakıőlar
- Sürekli öksürük
- Kiőilik deđiőimi
- Ani duygudurum deđiőiklikleri
- Öfke
- Sorumsuz davranıőlar
- Kendilik deđerinde azalma
- Muhakemede bozulma
- Depresyon ve genel bir ilgi kaybı
- Aile içi tartıőmaların artması
- Kuralların çıđnenmeye baőlaması
- Aileden uzaklaőma
- Okula ilginin azalması
- Olumsuz tutumlar
- Baőarının düőmesi
- Devamin azalması
- Okulu kırma
- Disiplin sorunları
- Sık sık borç alma

METAMFETAMIN KULLANIM İŞARETLERİ

- Saçı ve cildi takıntılı bir şekilde yolma,
- Fiziksel görünümün bozulması (zayıflama saç kaybı, saçlarda incelme, ağız ve diş yapısında bozulma, ciltte yaralar)
- Garip uyku düzeni,
- Paranoya ve halüsilasyonlar
- Aralıksız konuşma ve anlamsız enerji hali
- Aşırı terleme
- Kötü vücut kokusu
- Methamfetamin (meth) ile ilgili konulara aşırı ilgi

ŞÜPHE DURUMUNDA BAŞVURULABİLECEK TESTLER

İdrar testi:

İdrar testleri hızlı ve ucuzdur aynı zamanda evde yapılabileceği için gizlilik de korunmuş olur. Kişinin kullandığı maddeye göre değişmekle birlikte genellikle 3 günlük kullanım hakkında bilgi verir.

Kan testi:

İdrar testine göre yanılma ve yanılma payı daha azdır. Güvenilir sonuçlar vermesi için madde kullanımından çok kısa bir süre sonra yapılması gerekir.

Saç testi:

Saç numunesinde uyuşturucu testi 4 ile 6 ay içinde madde kullanımına dair bilgi verir.

Swab tükürük testi:

Tükürük testleri idrar testleri için bir alternatiftir. Her ne kadar parametre sayısı idrar testleri kadar fazla olmasa da idrar örneği almanın mümkün olmadığı zamanlarda kullanılabilir.